

2022年及2023年疾病预防及治疗情况

月份	规格	易发病情	采取措施	常规药品用量
1月份	所有鱼	水温降低, 平均水温6℃左右。鱼摄食量减少, 鱼体抵抗力降低, 投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、每月初所有网箱生石灰消毒防疫一次。 二、每月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次; 三、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶, 连续5天。每月1次。	一、生石灰10-15公斤/亩。 二、水霉净30-50瓶/网箱(挂瓶)。 三、聚维酮碘2-4瓶泼洒
2月份	所有鱼	水温降低, 平均水温4-6℃左右。鱼摄食量减少, 鱼体抵抗力降低, 投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶, 连续5天。每月1次。	一、水霉净30-50瓶/网箱(挂瓶)。 二、聚维酮碘2-4瓶泼洒
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患肿鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵, 连续7天。 三、鱼苗肿鳃严重可以盐浴。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%, 盐浴时间30分钟-60分钟。
3月份	所有鱼	水温降低, 平均水温4℃左右。鱼摄食量减少, 鱼体抵抗力降低, 投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、每月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶, 连续5天。每月1次。	一、水霉净30-50瓶/网箱(挂瓶)。 二、聚维酮碘2-4瓶泼洒
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患肿鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵, 连续7天。 三、鱼苗肿鳃严重可以盐浴。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料, 肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%, 盐浴时间30分钟-60分钟。
4月份	所有鱼	水温回升至6℃以上, 细菌性疾病容易感染, 三代虫易感染。鱼摄食量开始增加, 鱼体免疫力开始增强, 投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、每月初所有网箱生石灰(或消毒王)消毒防疫一次。不可同时使用 二、每月中、下旬所有网箱挂水霉净预防水霉2次; 三、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶, 连续5天。每月2次	一、生石灰10-15公斤/亩。 二、消毒王1ppm。 三、水霉净20-30瓶/网箱(挂瓶)。 四、聚维酮碘1ppm.
	50g以下	三代虫易感染	保持网衣清洁, 每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周一次, 投喂指环虫K粉预防三代虫。鱼苗每天镜检1次	指环虫K粉每公斤饲料10g-15克。连续投喂10天。
			一、加强水质管理, 关注理化指标变化。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料, 肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂

	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易	二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗肿鳃严重可以盐浴。	公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。
5月份	所有鱼	水温回升至9℃以上,细菌性疾病容易感染,三代虫易感染。鱼摄食量开始增加,鱼体免疫力开始增强,投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、每月中、下旬所有网箱挂水霉净预防水霉1次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月2次 三、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵,连续7天。 四、养殖三场所有网箱挂塘毒底净改善水质。每月2次。	
	50g以下	三代虫易感染	保持网衣清洁,每月洗网2次以上。及时更换网衣,降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次,投喂指环虫K粉预防三代虫。鱼苗每天境检1次	指环虫K粉每公斤饲料10g-15克。连续投喂10天。
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易	一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗肿鳃严重可以盐浴。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。
6月份	所有鱼	水温升至16℃左右,细菌性疾病容易感染,易烂鳃,三代虫易感染。鱼摄食量开始增加,鱼体免疫力开始增强。投喂、分箱等易发生机械损伤,进而造成细菌感染。	一、每月初所有网箱生石灰(或消毒王)消毒防疫一次。不可同时使用。 二、每月中旬所有网箱挂消毒王预防细菌性疾病一次; 三、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月2次 四、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵,连续7天。 五、养殖三场所有网箱挂塘毒底净改善水质。每月2次。	一、生石灰10-15公斤/亩 二、消毒王1ppm。 三、聚维酮碘1ppm。
	50g以下	三代虫易感染	保持网衣清洁,每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次,投喂指环虫K粉预防三代虫。鱼苗每天境检1次	指环虫K粉每公斤饲料10g-15g。连续投喂10天。
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易	一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗肿鳃严重可以盐浴。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。
		水温升至18℃左右,细菌性疾病容易感染,易烂鳃,小瓜虫、三代虫	一、每月初所有网箱生石灰(或消毒王)消毒防疫一次。不可同时使用 二、每月中旬所有网箱挂消毒王预防细菌性疾病一次;	一、生石灰10-15公斤/亩

7月份	所有鱼	易感染。鱼摄食量开始增加，鱼体免疫力开始增强，投喂、分箱等易发生机械损伤，进而造成细菌感染。	三、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月2次 四、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵，连续7天。 五、养殖三场所有网箱挂塘毒底净改善水质。每月2次。	二、消毒王1ppm。 三、聚维酮碘1ppm。
	50g以下	三代虫、小瓜虫易感染	保持网衣清洁，每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次，投喂指环虫K粉预防三代虫。槟榔和辣椒挂袋，投喂瓜虫净预防小瓜虫。鱼苗每天境检1次	一、指环虫K粉每公斤饲料10g-15g。连续投喂10天。二、瓜虫净每公斤饲料10克-15克，连续投喂10天
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易	一、加强水质管理，关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，连续7天。 三、鱼苗肿鳃严重可以盐浴。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
8月份	所有鱼	水温升至20℃以上，细菌性疾病容易感染，易烂鳃，小瓜虫、三代虫易感染。鱼摄食量减少，鱼体免疫力降低，应减少投喂量，减少投喂次数，避免应激反应造成死亡。投喂、洗网等易发生机械损伤产生细菌感染。	一、每月初所有网箱生石灰（或消毒王）消毒防疫一次。不可同时使用 二、每月中旬所有网箱挂消毒王预防细菌性疾病一次； 三、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶/箱，连续5天，每月2次 四、鱼苗每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵，连续7天。 五、养殖三场所有网箱挂塘毒底净改善水质。每月2次。	一、生石灰10-15公斤/亩 二、消毒王1ppm。 三、聚维酮碘1ppm。
	50g以下	小瓜虫、三代虫易感染	保持网衣清洁，每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次，投喂指环虫K粉预防三代虫。槟榔和辣椒挂袋，投喂瓜虫净预防小瓜虫。鱼苗每天境检1次。	一、指环虫K粉每公斤饲料10g-15g。连续投喂10天。 二、瓜虫净每公斤饲料10克-15克，连续投喂10天
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易	一、加强水质管理，关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，连续7天。 三、鱼苗肿鳃严重可以盐浴。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。可同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
	所有鱼	水温下降至18℃左右，细菌性疾病容易感染，三代虫易感染。鱼摄食量开始增加，鱼体免疫力开始增强，洗网、投喂、分箱等易发生机械损伤。造成细菌感染。	一、每月初所有网箱生石灰（或消毒王）消毒防疫一次。不可同时使用 二、每月中旬所有网箱挂消毒王预防细菌性疾病一次； 三、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月2次 四、鱼苗	一、生石灰10-15公斤/亩 二、消毒王1ppm。 三、聚维酮碘1ppm。

9月份		以网箱养殖为主，但网箱密度不宜过大。	分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵，连续7天。	
	50g以下	三代虫易感染	保持网衣清洁，每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次，投喂指环虫K粉预防三代虫。	指环虫K粉每公斤饲料10g。连续投喂10天。
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易病	一、加强水质管理，关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，连续7天。 三、鱼苗肿鳃严重可以盐浴。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。可同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
10月份	所有鱼	水温降至15℃左右，细菌性疾病容易感染。鱼摄食量开始增加，鱼体免疫力开始增强，投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、每月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次； 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月2次 三、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵，连续7天。 四、养殖三场所有网箱挂塘毒底净改善水质。每月2次。	
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易病	一、加强水质管理。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，各连续7天。 三、鱼苗肿鳃严重可以盐浴。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
11月份	所有鱼	水温降至11℃左右，细菌性疾病容易感染。鱼摄食量开始增加，鱼体免疫力开始增强，洗网、投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、每月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次； 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月2次 三、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵，连续7天。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易病	一、加强水质管理，关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，连续7天。 三、鱼苗肿鳃严重可以盐浴。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
12月份	所有鱼	水温降至8℃左右，细菌性疾病容易感染。鱼摄食量开始下降，鱼体免疫力开始减弱，洗网、投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、每月初所有网箱生石灰（或消毒王）消毒防疫一次。不可同时使用 二、每月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次； 三、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月2次 四、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵，连续7天。	一、生石灰10-15公斤/亩 二、消毒王1ppm。 三、水霉净20-30瓶/网箱。（挂瓶） 四、聚维酮碘1ppm。
			一、加强水质管理，关注理化指标变化。	一、三黄散2克-4克/公斤饲料，肝胆多维2克/

	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易	二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，连续7天。 三、鱼苗肿鳃严重可以盐浴。	公斤饲料，同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
--	--------	------------	--	--